

(1844).

15. *Anandria Anandria* HUTH in Helios. XI, 133 (1893).16. *Anandria laevipes* GANDOGAR in Bull. Soc. Bot. France. LXV, 38 (1918)

最後ニ Flora 第 27 卷ヲ貸與サレタ朝比奈教授ニ深謝シママス。 (中井猛之進)

Oいととりげもハ新種ナリ

いととりげもハ植物學雜誌 XLIX 卷 774 頁ニ三木茂君ガ完全ナ圖解ヲシテ居ル。三木氏ハ學名ニ北米ノ東岸地方ニアル *Najas gracillima* MAGNUS ヲ當テ、居ルガ私ハ之ヲ新種ト考定スル。兩種ノ區別ト新種ノ名ハ次ノ通り。

***Najas japonica* NAKAI** いととりげも。

葉ノ長サ 1.5 cm. 兩側ニ鋸齒アリ。種子ハ長サ 2 mm. 種皮ノ細胞ハ長サガ幅ノ 5-10 倍アリ。(Foliis 1.5 cm. longis utrinque 7-10 dentatis, seminibus 2 mm. longis, areolis seminum longitudine latitudinem 5-10 plo superantibus ex *N. gracillima* optime dignoscenda).

***Najas. gracillima* MAGNUS.**

葉ノ長サハ 2-2.5 cm. 先ニノミ鋸齒ガ集ル。種子ハ長サ 2.5-3 mm. 種皮ノ細胞ハ長サガ幅ノ 2 倍ナリ。

(中井猛之進)

Oてりみのいぬほづきハ新種デハナイ

臺灣ノ小田島君ガてりみのいぬほづきヲいぬほづきカラ分ケテ熱帶農學會報 VIII 卷ニ記述シ又圖解シタノハ正當ノ見解デハアルガ、惜シイコトニ新種ニシテ *Solanum photinocarpum* NAKAMURA & ODASHIMA トシタ。此種ハ我邦デハ九州、琉球、臺灣ニ産スルガ國外デハフキリッピン群島、馬來諸島、南支、印度支那、馬來地方等ヲ始メ亞細亞、北米ノ熱帶、暖帶ニ廣ク産シ學名ト異名トハ次ノ通りデアル。

(學名) ***Solanum alatum* MOENCH**, Methodus 474 (1794), non DUNAL 1813, nec SEEMANN & SCHMIDT 1844.

(異名) *Solanum nigrum* ε *virginicum* L. Sp. Pl. ed. 1, I, 186 (1753), non *Solanum virginicum* L. l. c. 187.

Solanum pterocaulon DUNAL, Hist. 153 (1813).*Solanum judaicum* (non BESSER 1809) BLUME, Bijdr. 694 (1826).*Solanum nigrum* c. *judaicum* MIQUEL, Fl. Nederl. Ind. II, 637 (1856).

Solanum photinocarpum NAKAMURA & ODASHIMA in Journ. Trop. Agric. VIII 54, t. 2 A-D (1936), nov. syn. (中井猛之進)

Oかかやんばら本州ニ産ス

珍物發見ノ記録保持者ノ一人トモ云フベキ岸田松若氏ガばらノ一種ヲ吳レタ、ソレハ同氏ガ昭和 11 年 8 月 21 日四日市ノ海岸デ探ラレタモノアル、然シテ氏ノ言ニ徴スルニ相當ニ澤山生エテ居ル由。種類ハ云フ迄モナク *Rosa bracteata* WENDL. 和名かかやんばら、